Deripil Gel

Eritromicina Base

GEL

COMPOSICIÓN
Cada ml de gel contiene:
Eritromicina(D.C.I.)Base.....20 mg
Excipientes: 94 % de etanol, hidroxipropilcelulosa, propilenglicol, c.s

PROPIEDADES
Aunque el mecanismo de acción por el que actúa la eritromicina tópica reduciendo las lesiones inflamatorias del acné vulgar es desconocido, parece ser que es debido a su acción antibiótica.

INDICACIONES
Tratamiento tópico del acné.

POSOLOGIA Y ADMINISTRACION
La dosis usual es de 2 aplicaciones al día.
Aplicar el gel sobre sobre las áreas afectadas por la mañana y por la noche, después de lavar a fondo, enjuagar bien y secar convenientemente las zonas a tratar.
Lavar las manos después de la aplicación.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la eritromicina y/o componentes.

PRECAUCIONES
No se ha establecido a inocuidad de su uso durante el embarazo ni el periodo de lactancia.
Este preparado es sólo para uso externo. Deberá evitarse su contacto con los ojos, la nariz la boca u otras mucosas.

ADVERTENCIAS
Advertencias sobre excipientes
Por contener etanol como excipiente, las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de la piel.

INTERACCIONES
Cuando se utilice la eritromicina tópica al mismo tiempo que otros tratamientos tópicos para el acné, especialmente agentes abrasivos descamantes, se deberá tener en cuenta que se pueden potenciar los efectos de dichos productos

EFECTOS SECUNDARIOS
Se han descrito casos leves de eritema, sequedad de la piel, piel escamosa, prurito, irritación de los ojos y/o sensación de ardor.
La utilización de agentes antimicrobianos (especialmente en terapias prolongadas o repetidas) puede estar asociada con la proliferación de gérmenes resistentes a los antibióticos. Si esto ocurriera, se suspenderá la administración del antibiótico y se tomarán las medidas apropiadas.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO
Si se presentase una reacción de hipersensibilidad deberá suspenderse la utilización del producto y tratar al paciente, si fuese necesario, con los medicamentos adecuados. Si de forma accidental se pone en contacto con los ojos o mucosas, lavar con abundante agua fría.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

PRESENTACION
Tubo con 70 g. de gel.

OTRAS PRESENTACIONES
DERIPIL Solución. Frasco con 70 ml de solución.

CON RECETA MEDICA

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños

FABRICADO POR:
Laboratorio Reig Jofré, S.A.
08024 Barcelona

Laboratorios GALDERMA, S.A.
Agustín de Foxá, 29
28036 Madrid

Deripil Solución

Eritromicina Base

SOLUCIÓN

COMPOSICIÓN
Cada ml de solución contiene:
Eritromicina(D.C.I.)Base.....20 mg
Excipientes: 82 % de etanol , propilenglicol, Neo-PLC, c.s

PROPIEDADES
Aunque el mecanismo de acción por el que actúa la eritromicina tópica reduciendo las lesiones inflamatorias del acné vulgar es desconocido, parece ser que es debido a su acción antibiótica.

INDICACIONES
Tratamiento tópico del acné.

POSOLOGIA Y ADMINISTRACION
Aplicar la solución sobre las áreas afectadas por la mañana y por la noche, después de lavar a fondo, enjuagar y secar convenientemente las zonas a tratar.
Lavar las manos después de la aplicación.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a la eritromicina y/o componentes.

PRECAUCIONES
No se ha establecido la inocuidad de su uso durante el embarazo ni el periodo de lactancia. Este preparado es sólo para uso externo. Deberá evitarse su contacto con los ojos, la nariz, la boca u otras mucosas.

ADVERTENCIAS
Advertencias sobre excipientes
Por contener etanol como excipiente, las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de la piel.

INTERACCIONES
Cuando se utilice la eritromicina tópica al mismo tiempo que otros tratamientos tópicos para el acné, especialmente agentes abrasivos, se deberá tener en cuenta que se pueden potenciar los efectos de dichos productos

EFECTOS SECUNDARIOS
Se han descrito casos leves de eritema, sequedad de la piel, piel escamosa, prurito, irritación de los ojos y/o sensación de ardor.
La utilización de agentes antimicrobianos (especialmente en terapias prolongadas o repetidas) puede estar asociada con la proliferación de gérmenes resistentes a los antibióticos. Si esto ocurriera, se suspenderá la administración del antibiótico y se tomarán las medidas apropiadas.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO
Si se presentase una reación de hipersensibilidad deberá suspenderse la utilización del producto y tratar al paciente, si fuese necesario, con los medicamentos adecuados. Si de forma accidental se pone en contacto con los ojos o mucosas, lavar con abundante agua fría.
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

PRESENTACION
Frasco con 70 ml de solución.

OTRAS PRESENTACIONES
DERIPIL Gel. Tubo con 70 g. de gel.

CON RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FABRICADO POR:
Laboratorio Reig Jofré, S.A.
08024 Barcelona

Laboratorios GALDERMA, S.A.
Agustín de Foxá, 29
28036 Madrid